

FILOCAL[®]

20 LITRÓW

Calcium

SKŁAD PRODUKTU FILOCAL CALCIUM

Czerwony		
Tlenek wapnia (CaO)	18%	rozpuszczalny w wodzie
Wapń (Ca)	12%	rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu (MgO)	0.15%	rozpuszczalny w wodzie

Zgodność z normami Unii Europejskiej.

UWAGA: CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

WSKAZÓWKI ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI PODCZAS

STOSOWANIA: Produkt przeznaczony jest tylko do stosowania w ogrodnictwie i tylko do celów opisanych na etykiecie. Jest szkodliwy w przypadku połknięcia. Kontakt z preparatem może powodować podrażnienia oczu, śluzówki nosa, gardła i skóry. W przypadku połknięcia wywołać wymioty i skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się preparatu do oczu płukać obficie wodą co najmniej 15 min. i skontaktować się z lekarzem.

Warunki zakupu: Sprzedawca gwarantuje, że do produkcji preparatu użyto tylko pełnowartościowych składników, a preparat służy tylko do celów zgodnych z zastosowaniem. Nikt poza producentem nie jest uprawniony do wydawania instrukcji użycia oraz gwarancji producenta. Z uwagi na brak możliwości kontroli przez producenta czasu, miejsca oraz ilości użytego preparatu, ogranicza się jego odpowiedzialność tylko do wymiany produktu lub do zwrotu ceny zakupu.

PRZECHOWYWAĆ W CHŁODNYM I CIEMNYM MIEJSCU (W TEMPERATURZE DO +5°C) PRZED UŻYCIEM MOCNO WSTRZĄSAĆ

FILOCAL składa się z 3 rodzajów nawozów:

1. Czarny (Foliar Feed)
2. Czerwony (Calcium)
3. Niebieski (Mikro)

Najpierw należy napęlić zbiornik do 66% potrzebnej cieczy roboczej, następnie dodać Filocal. Włączyć mieszadło.

Filocal nie wchodzi w reakcję z większością obecnie stosowanych preparatów do oprysków.



Szkodliwy

	FiloCal czarny	FiloCal czerwony	FiloCal niebieski
Zastosowanie:	l/ha	l/ha	l/ha
jabłonie/grusze			
Od pojawienia się liści	3	3	1
2 tygodnie po kwitnieniu	3	3-6	1
Stosowanie co 7-10 dni	3	6	0,5
2 tygodnie przed zbiorem	0	6	1
na lepsze wybarwienie			
2 zabiegi			
2 zabiegi po zbiorach	3	6	1
wiśnie			
Od pojawienia się liści	4	4	1
2 tygodnie po kwitnieniu	4	4	1
Stosowanie co 7-10 dni			
Tydzień przed zbiorem	0	8	1,5
2 zabiegi po zbiorach	4	8	1
śliwy/brzoskwinie/morele			
Na pierwszy liść	0	0	1
Od pierwszych liści	5	6	1
2 tygodnie po kwitnieniu	0	8	1
Stosowanie co 7-10 dni			
Tydzień przed zbiorem	0	8	2
2 zabiegi po zbiorach	5	8	1,5
winogrona			
Od pierwszych liści			
Stosowanie co 7-10 dni	5	0	1
6 tygodni pokwitnieniu 3 zabiegi	5	10	1
Aż do zbiorów	5	0	1

jeżyny/truskawki/porzeczki itp.

Od pierwszych liści			
Stosowanie co 7-10 dni	4-6	2-3	1-2
Po zbiorach co 14-20 dni			

HS-CodeNr: 31059099

Dystrybutor: FiloCal Polska
Bikówek 12, 05-600 Grójec
www.filocal.pl

Producent:

EUROPEAN FRUITSERVICE BOARD (EFB B.V.)
Zandweg 195 3454 HE De Meern – Holland
Fax: +31 (0)30 6622275 www.filocal.nl

